


## NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

### UWAGA!

Lek Valinger przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek jest dla Ciebie, jeżeli jesteś dorosłym ( $\geq 18$ . r.ż.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek **NIE** jest dla Ciebie!

<p>Czy stosujesz leki używane do łagodzenia <b>objawów choroby wieńcowej</b> (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których przyjmowanie wraz z lekiem Valinger może <b>zagrozić Twojemu życiu</b>?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nitroglicerynę</b> (np. Nitrocard, Nitroderm, Nitromint, Minitran, Sustonit)</li> <li>• <b>izosorbid</b> (np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard, Sorbonit)</li> <li>• <b>pentaerytrytol</b> (np. Galpent, Pentaerythritol compositum)</li> <li>• <b>molsydominę</b> (np. Molsidomina WZF)</li> <li>• <b>nikorandyl</b> (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma)</li> </ul>	<b>TAK</b>	<b>NIE WIEM</b>	<b>NIE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy stosujesz lek <b>riocyguat</b> (np. Adempas) używany do leczenia <b>tętniczego nadciśnienia płucnego</b> (wysokiego ciśnienia w płucach), którego przyjmowanie wraz z lekiem Valinger może doprowadzić do objawowego niedociśnienia i <b>zagrozić Twojemu życiu</b>?</li> </ul>	<b>TAK</b>	<b>NIE WIEM</b>	<b>NIE</b>
<p><b>Czy występują u Ciebie następujące objawy?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w ciągu <b>ostatnich 2 miesięcy</b> pojawił się ból za mostkiem w klatce piersiowej</li> <li>• w <b>ciągu ostatniego miesiąca</b> zauważyłeś <b>wyraźne</b> pogorszenie samopoczucia</li> <li>• <b>zwykle</b>, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub <b>wyraźne</b> zmęczenie</li> <li>• <b>często</b> odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca</li> <li>• <b>często</b> miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania</li> <li>• masz <b>zwykle</b> niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)</li> <li>• masz <b>zwykle</b> wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg)</li> </ul>	<b>TAK</b>	<b>NIE WIEM</b>	<b>NIE</b>
<p><b>Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w ostatnich 6 miesiącach przeżyłeś zawał serca lub udar mózgu</li> <li>• w przeszłości doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała</li> <li>• masz skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub rozpoznaną chorobę Peyroniego (stwardnienie</li> </ul>	<b>TAK</b>	<b>NIE WIEM</b>	<b>NIE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>plastyczne prącia)</li> <li>• stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające syldenafil</li> <li>• leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV</li> <li>• utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra</li> <li>• rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)</li> <li>• rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkową)</li> <li>• rozpoznano u Ciebie marskość wątroby</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty)</li> <li>• ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)</li> <li>• białaczkę (choroba nowotworowa krwi)</li> <li>• szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Czy obecnie chorujesz na:</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE WIEM</b>	<b>NIE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty)</li> <li>• ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)</li> <li>• białaczkę (choroba nowotworowa krwi)</li> <li>• szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### **PAMIĘTAJ!**

Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzroku. Występowanie zaburzeń wzroku jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym chorób serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzrodem i o tym, że przyjmujesz Valinger.